

EARLY ASSESSMENT AND SUPPORT ALLIANCE

503-988-3272 REFERRAL LINE
503-988-5870 FAX



Hoja de Datos de la Psicosis para los Profesionales

Síntomas de Psicosis

Cualquier persona puede desarrollar psicosis, sin embargo usualmente el comienzo es de la juventud hacia al principio de ser adulto. Es más probable que ocurra durante la juventud entre las edades de 15 a 30 años. Tres de cada 100 personas experimenta un episodio psicótico. Los síntomas pueden aparecer poco a poco, pero el comienzo tiende a ser antes para los hombres.

Los Primeros Síntomas

- Dificultad al seguir conversación o entender frases
- Cambios en el comportamiento de la persona, tales como el retiro de sus actividades sociales
- Aumento de la sensibilidad a la entrada sensorial
- Un cambio en la forma que la persona percibe sentimientos, pensamientos y percepciones

Síntomas Agudos

- Alucinaciones, como ver o escuchar cosas que no existen
- Ilusiones: creencias falsas sobre la realidad que se adhieren a pesar de la evidencia al contrario
- Comportamiento raro o fuera de carácter, temerario o peligrosamente impulsivo
- Grandes cambios en los patrones de dormir o comer

La Importancia de la Intervención Temprana y el Tratamiento

Las consecuencias del retraso en el tratamiento incluyen el potencial de una lenta e incompleta recuperación, deshacer la vida familiar de la persona, la escuela o la vida laboral y la interferencia con el desarrollo psicológico y social. Hay también un mayor riesgo de depresión y el suicidio, la adicción, y la participación con el sistema de justicia penal. Para estas razones y más, la intervención temprana ha sido el estándar de la atención a la psicosis en la mayoría del mundo occidental desarrollado desde la década de los 90.

¿Quién Debe Referirse al Programa de EASA?

Si usted tiene una persona joven en su cuidado que usted cree que podría exhibir signos tempranos de la psicosis no causada por una condición médica conocida o por el uso de drogas, póngase en contacto con EASA al 503-988-3272 para información de referencia. El equipo actualmente sirve a los jóvenes de edades entre 15 y 25 años.

¿Cómo Funciona el Equipo de EASA?

Los médicos y profesionales de la salud mental que componen el equipo de EASA trabajan en colaboración con las comunidades locales la atención primaria y los médicos para reducir los retrasos en el acceso a tratamiento. Una vez que una persona joven está en el programa, se evalúa él o ella para determinar las necesidades de tratamiento. Si la medicación es necesaria, los prescriptores de EASA utilizan dosis bajas de medicaciones anti-psicóticas para evitar los efectos secundarios que pueden interferir con el tratamiento. También se proporcionan consejería, terapia, y asistencia práctica y psicosocial, y terapia profesional y ocupacional. La familia y los amigos de la persona joven son considerados parte del equipo de tratamiento y son tratados como tales.

Los Resultados de los Programas de Intervención Temprana

El programa de EASA se basa en el éxito de la Asesoría Temprana y Equipo de Apoyo (EAST por sus siglas en inglés), un programa iniciado por Mid-Valley Behavioral Care Network en el año 2001. De 2001 a 2006, la incidencia de hospitalización entre los 300 participantes del programa se redujo en un 50% a 10% y sigue disminuyendo. 74% de los participantes del programa experimentaron una remisión de sus síntomas o sólo perturbación ligera de sus síntomas por un año. Aproximadamente 70% de los participantes permanecieron en la escuela o el trabajo.

Llame al equipo de EASA al 503-988-3272 si tiene preguntas o para hacer una referencia al programa.



DEPARTMENT OF COUNTY HUMAN SERVICES
MENTAL HEALTH AND ADDICTIONS SERVICES DIVISION
421 SW OAK ST. PORTLAND, OR 97204

503-988-5464
503-988-5870 Fax