

La vacuna contra el VPH es todo sobre la prevención del cáncer*



Public Health
Prevent. Promote. Protect.

¿Por qué someter un niño a una serie de inyecciones cuando él o ella no son sexualmente activos?

Para que esta vacuna funcione, tenemos que proteger a los niños antes de su primer encuentro sexual. Y, si se administra la vacuna a la edad de 11 o 12 años significa una mejor respuesta inmunológica que la que se ven en los adultos. Lo que significa una mayor protección. Lo que significa menos cáncer.

Se ha sabido por mucho tiempo que el VPH es responsable de casi todos los casos de cáncer de cuello uterino en las mujeres.

El VPH es un virus que se propaga por contacto de piel a piel, de persona a persona. A menudo esto ocurre durante el contacto sexual, pero también puede ser transmitido de la madre al niño. Muchas de las personas que tienen el VPH no se dan cuenta, es decir que siguen transmitiendo la infección a otros. Es por eso que unos 6 millones de personas están infectadas anualmente con el VPH. Y mientras que el VPH cause verrugas en los genitales, no es lo que molesta los médicos. Lo que les molesta es que el VPH causa cáncer.

La buena noticia es que hay una nueva vacuna que puede protegernos de los tipos más comunes del VPH que causan cáncer.

Se recomienda que las niñas entre las 11 y 12 años de edad reciban 3 dosis de la vacuna. A partir del 2011, esto se amplió para incluir la vacunación de niños. ¿Por qué? Debido a que casi 12,000 mujeres al año son diagnosticadas en los EE.UU. con el cáncer del cuello uterino y aproximadamente 4,000 mueren anualmente de la enfermedad, alrededor de 7,000 hombres también son diagnosticados cada año con un cáncer relacionado con el VPH. VPH es una causa conocida de cánceres del pene, cánceres anales, y cánceres de la boca y garganta en los hombres.

La vacuna contra el VPH ha tenido una historia de ser segura y ha demostrado ser muy eficaz



photo by James Gathary

en la prevención de VPH. Según un estudio publicado por el CDC, el frecuencia de papillomavirus humano ha disminuido entre jovencitas en el 56%, a pesar de estar disponible desde sólo 2006. A partir del junio de 2006 - marzo de 2013, aproximadamente 57 millones de dosis de vacunas HPV se distribuyeron y 22,000 acontecimientos adversos se autorelataron. El noventa y dos (el 92%) se clasificaron como acontecimientos "no graves" como dolor, reparación, hinchazón, desmayo, mareo, náusea, dolor de cabeza, fiebre, urticaria. Entre los informes cifrados como "graves", el dolor de cabeza, la náusea, los vómitos, la fatiga, el mareo, el desmayo y la debilidad generalizada son los síntomas el más con frecuencia relatados.

Si tienes preguntas sobre la vacuna contra el VPH, consulte a su médico para que todas sus preguntas pueden ser contestadas.

Para más información:

www.cdc.gov/hpv/

La vacuna contra VPH no trata la enfermedad, sino más bien la prevenía, entonces la vacuna se debe dar a los adolescentes antes de ser expuestos al virus.

*Incluye información de www.shotofprevention.com (January 24, 2013) por Dr. Lara Zibners