

冠狀病毒 新型冠狀病毒

餐飲業和食品服務業的清潔及消毒指南

新型冠狀病毒是2019年首次檢測出的新型病毒。新型冠狀病毒會導致發熱、咳嗽和/或呼吸困難。對大多數人來說，這種病毒所引發的症狀由輕度到中度不等，但它能在易受感染的人群中引起嚴重併發症或導致死亡。

使用常規清洗步驟

早期證據表明，新型冠狀病毒可以在室內溫度下存活數天。但此時不推薦常規清洗和消毒以外的特殊處理流程。常規的家用清潔劑，以及普通的漂白溶液（1大勺漂白劑）已被證明能有效地防止新型冠狀病毒和其他病毒的傳播。

漂白劑

用於肉眼不可見的污染

混和



1大勺
漂白劑

+



1加侖
水

- 查看漂白劑上的保質期，並確定其開啟時間未超過6個月。
- 與表面接觸1分鐘，然後用水沖洗乾淨。
- 在空曠的地方使用漂白劑。
- 請勿與其他化學品或肥皂混用。
- 清潔過程中防止與食物發生化學物接觸。
- 消毒區域時使用手套，完成後將其扔進垃圾桶。

訪問 multco.us/covid19
以獲取最新資訊。

經常觸摸的表面

應經常清潔，例如：



遙控器




廚房
櫃檯表面



門把手



衛浴
櫃檯表面




鍵盤



輪椅和助
行器



桌椅



手機和平板電腦

清潔和消毒

- 請切記，清潔和消毒是不一樣的。用肥皂和水去清除表面的污垢和食物。用化學物質或加熱消毒可以減少病菌。看起來乾淨的表面上，可能還有你看不見的細菌。消毒將這些細菌降低到更安全的水準。
- 清潔和消毒經常接觸的物體表面。遙控器、廚房櫃檯、門把手、衛浴設施、鍵盤、桌椅以及電話和平板電腦等表面應該經常清潔。
- 按照清潔劑上的說明，物體表面需要保持濕潤多長時間才能有效。
- 每次使用後，接觸食物的表面應清洗、漂洗和消毒。

在工作場所 防止疾病傳播

- 所有員工必須保持良好的洗手和衛生習慣。
- 避免徒手接觸即食食品。
- 使用漂白劑清潔步驟徹底清潔工作區域。
- 生病時不要來上班。



日常疾病預防

採取簡單的步驟，來維護一個健康的工作環境。這些日常預防非常重要，尤其是在預防新型冠狀病毒和流感等呼吸性疾病的傳播。

- 在工作場所的入口處、洗手間、員工休息室和其他看得見的地方張貼標語，支持生病時在家裡隔離，咳嗽和打噴嚏時遮蓋口鼻，經常用溫肥皂水洗手。
- 提醒人們避免用未經洗淨的手觸摸眼睛、鼻子和嘴。
- 按照建議清潔和消毒您的工作區。

員工健康指南

員工必須：

在出現以下情況時，告訴負責人 並停止工作：

- 有甲型肝炎、沙門氏菌、志賀氏菌、大腸桿菌和諾如病毒的情況。
- 在過去的24小時內有過腹瀉或腹瀉嘔吐，發熱或腹部絞痛的症狀。

感染新冠病毒的人員一律不得進入學校、兒童設施和醫療衛生機構的餐飲場所或任何食品服務設施，或在其中工作。

負責人必須：

- 讓員工遠離食品設施，如果他們在過去24小時內出現上述任何一種疾病或症狀。
- 如果員工感染甲型肝炎、沙門氏菌、志賀氏菌、大腸桿菌和諾如病毒，應向衛生部門報告。

提倡正確洗手的方式

- 確保洗手標誌張貼在員工能看到的地方。
- 用肥皂和溫水徹底洗手至少20秒。
- 用紙巾擦乾手，並把紙巾扔進垃圾桶。

以下情況記得勤洗手：

- 在咳嗽、打噴嚏和擦鼻子後洗手。
- 使用完衛生間後洗手。
- 處理食物時洗手。
- 從處理生的食物轉換到即食食物時洗手。
- 在觸摸你的臉或頭髮後洗手。
- 在接觸動物後洗手。
- 進食或使用了煙草/尼古丁後洗手。
- 在處理金錢或其他形式的付款後洗手。
- 在處理骯髒的設備或用具後洗手。
- 在佩戴一次性手套前洗手。
- 以及每當手變髒的時候洗手。

新型冠狀病毒的情況瞬息多變。在multco.us/covid19上關注清潔、消毒和報告要求的變化。